

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Observations techniques Vigne N°15 – 03 Juillet 2024

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Nord Aquitaine (24, 33, 47) et Sud Aquitaine (40,64,32). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.

→ L'ESSENTIEL



Risque faible



Risque moyen



Risque fort




Info

Physiologie	Météo	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Tordeuses	Cicadelles	Règlementation
Grain de plomb à mi-fermeture	Semaine fraîche et averses, orage pré-senti samedi	Risque fort, nouvelle sortie feuille et grappe	Risque fort, nouvelles sorties sur baie	risque faible à moyen, Baie touchée	Vol G2, ponte en cours, 1 ^{er} insecticide positionné	Population faible	Grêle : CMD repoussées au 31 juillet

→ MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gironde (Artigues près Bordeaux)

Prévision Pyrénées Atlantique (Uzein)



Mer.03, Eclaircies en journée mais les températures restent un peu justes - se couvrant en soirée/nuit
 Jeu.04, Front atténué s'échouant sur la région avec quelques gouttes le matin puis les éclaircies s'élargissent
 Ven.05, Temps calme et ensoleillé (quelques cirrus) avec une chaleur estivale l'après-midi
 Sam.06, Instable avec de nombreux nuages, des averses et une nouvelle baisse des températures
 Dim.07, Plus ou moins nuageux et frais pour la saison sous l'influence océanique
 Lun.08, Vers un temps lumineux avec des températures repartant à la hausse
 Mar.09, Chaleur modérée et lourde avec un petit risque orageux

→ PHENOLOGIE

Floraison	Nouaison	Grains de plomb	Grain de pois	Mi Fermeture	Fermeture complète	Début véraison
Global						

En moyenne et selon les cépages, la vigne est au stade grain de plomb à mi-fermeture. La fermeture complète est localement noté et peut être masquée par la coulure et le millerandage très présent cette année. La pousse végétative est active et les entre-cœurs sortent rapidement après écimage. Les carences potassiques apparaissent, en plus des manganiques et chloroses déjà observées. En Gascogne et Gironde, les Colombards présentent un faible développement végétatif et des phénomènes d'enroulement des feuilles dans certains cas (excès d'eau peut en être la cause). De nouveaux épisodes très localisés de grêle ont causés quelques dégâts sur Listrac, St Estèphe, Genissac, Libourne.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
 SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

NOUVEAU

Découvrez le site web EVV
evv.fr



Suivez nous

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Grêle : CMD repoussées au 31 juillet

Les services de l'Etat ont accepté de repousser la date de conclusion des Conventions de Mise à Disposition (CMD) au 31 juillet pour les exploitations durement touchées par les violents orages de grêle des 17 et 18 juin derniers. La SAFER et l'ODG concerné sont chargées du contrôle de la mise en œuvre de cette dérogation et doivent veiller à la traçabilité précise et complète depuis la ou les parcelles vendangées.

→ NUTRITION:

↳ Sécurisation rendement

Basfoliar® Kelp est à appliquer à la nouaison puis renouvelé 15 j plus tard.

↳ Stratégie nutrificateur

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

↳ Stratégie plantation

Sur celles à venir, des biostimulants du type Basfoliar- Rhizo bio ou Acrecio, peuvent être appliqués afin de favoriser une bonne reprise du plant et un développement racinaire plus rapide.

→ VERS DE LA GRAPPE

Le vol de G2 est en cours sur notre réseau de piégeage alimentaire avec majoritairement des Eudemis. La Cochylys a été piégée ce début de semaine sur St Sulpice et cameyrac et Ste Radegonde. Les captures significatives et successives datent du 28/06 jusqu'au 03/07 et se situent sur les secteurs de St Germain du puch, Castillon, Monbazillac, Pomport, St Sulpice et cameyrac, Langonnais et Léognan. En Sud Aquitaine, les captures restent faibles et semblent localisées sur les vignobles de Tursan et Bellocq-Béarn et Armagnac.

Les pontes sont constatées en Nord Aquitaine depuis le 23/06 en secteurs précoces et les premiers ovicides seront positionnés cette fin de semaine.

En Sud aquitaine, les 1ers dépôts d'œuf auraient débutés le 28/06.

Il est essentiel de surveiller l'évolution du piégeage et/ou de réaliser des comptages de pontes afin de positionner au mieux un traitement si celui-ci doit être fait. Le stade « tête noire » est le stade optimal de l'œuf pour positionner un insecticide spécifique. Il se situe environ 10 jours après le début du vol ou 5-7 jours après le début des pontes.

→ CICADELLE(S)

Les larves de cicadelles des grillures restent faibles mais les populations d'adultes augmentent. Des populations de larves de l'ordre de 30 à 50% de feuilles occupées sont localement constatées secteur Est Langon et en Gascogne.

→ AUTRES RAVAGEURS

La présence d'acariose est toujours notée sur quelques plantes. Des galles phylloxériques sont plus fréquentes. Des dégâts de cigariers et la présence de Thrips et Malacosomes du Portugal sont constatés.



→ FAUNES AUXILIAIRES

Les Typhlodromes sont actifs. Les Chrysopes sont notés en nombres.

Depuis la mi- mars, la saison de nidification a commencé. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet. Site OFB, **Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 16 mars au 15 août.**

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

NOUVEAU

Découvrez le
site web EVV
evv.fr



Suivez nous    

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

→ MILDIOU

Mildiou: Risque toujours fort du 03 au 07/07

Nouvelles sorties depuis fin de semaine dernière: tache d'huile, rot gris, rot brun

Stade BBCH 75 à 79

Pluie potentielle du 06 au 09/07

Risque modélisé fort sous les pluies

Les pluies orageuses du 28 et 29/06 ont été très hétérogènes avec des hauteurs variant de 1 à 40 mm. Cette semaine avec pluies éparées et orage potentiel à venir, le risque mildiou reste fort sur l'ensemble du territoire Aquitain même dès 2 mm de pluie.

☞ Même sans pluie, les longues durées d'humectation des organes de la vigne, représentent des conditions toujours favorables au développement du Mildiou.

La durée d'incubation du Mildiou sur feuilles (généralement temps plus long sur grappe) cf. Flash tech N°13

En Nord Aquitaine, des sorties de taches sur feuilles sont observées depuis fin de semaine dernière et concernent l'ensemble du territoire. Ces sorties sont préférentiellement situées sur les jeunes feuilles et les entre-cœurs. Dans certaines situations, les niveaux d'attaques peuvent être importants. Sur grappes, le Rot brun commence à se superposer au rot gris et de nouvelles parcelles voient le mildiou s'installer depuis ce week-end. Les baies millerandées expriment du rot gris. En Médoc, sur Cabernet sauvignon, les grappillons (verjus) sont nombreux et en fleurs et se font coloniser par le rot gris.



En général le mildiou est contenu, mais certaines parcelles de Merlot, même Sémillon, se dégradent fortement. Les symptômes anciens sur feuilles et grappes ont repris de l'activité. A surveiller cette fin de semaine, les prochaines sorties probables de mildiou d'abord sur feuilles, suite aux pluies de semaine dernière.



Le risque Mildiou maintient son niveau élevé sur la majorité des secteurs. Surveiller l'arrivée des futures pluies orageuses afin de positionner un prochain traitement préventif.

Les infections détectées le 14/06 pourraient expliquer les nouveaux dégâts sur grappes vus ce début de semaine en Gironde et Bergeracois.

Les sorties sur feuilles et entre-cœurs observées depuis le 25/06 jusqu'au 30/06 découlent des contaminations du 18 au 23/06,

Les cumuls de pluies enregistrés fin de semaine dernière, même faibles, ont été contaminants et après incubation, des sorties de symptômes pourraient se produire sur feuille dès cette fin de semaine et autour du 10/07 sur grappes. En prévisionnel, sous les prochaines précipitations et dès 2 mm, de nouvelles contaminations se produiraient depuis le 06/07 jusqu'au 10/07. Il s'agirait encore, en partie, de contaminations issues du sol mais surtout de contaminations secondaires. Sur ces éventuelles contaminations, le modèle décrit des sorties de taches dès le 12/07.

Surveillez l'évolution des symptômes déjà présents pour s'assurer qu'en cas de sporulation de ceux-ci, des repiquages ne se produisent pas ou bien qu'ils soient maîtrisés par un traitement adéquat.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7
St Emilion	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cussac	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cenac	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Pomerol	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Berson	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cazaugitat	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Preignac	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Baron	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

NOUVEAU

Découvrez le site web EVV
evv.fr



Suivez nous evv.fr

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

En Sud Aquitaine, Le risque mildiou reste fort. La maladie semble toujours contenue mais de nouveaux symptômes ont été constatés ce début de semaine à la fois sur feuilles (tâche sporulante) et quelques pointes de grappes. L'Ugni blanc semble d'avantage affecté.

Ces sorties peuvent être inféodées aux pluies du 19 au 20/06.

Les pluies du 29 juin dernier, pourraient générer d'autres attaques visibles dès cette seconde moitié de semaine.

En prévisionnel, de nouveaux risques de contaminations surtout secondaires pourraient survenir sur les pluies potentielles du 05 au 10/07. Des sorties de symptômes seraient alors visibles entre le 10 et 16/07.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	
Jurançon	Mildiou	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Maumusson	Mildiou	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Cazaubon	Mildiou	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Geaune	Mildiou	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Condom	Mildiou	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

→ OIDIUM

Oïdium: Risque potentiel de contamination secondaire du 03/06 au 10/07

Stade sensibilité présent, 1er symptôme baie

Stade BBCH 75 à 79

Conta secondaires jusqu'au 10/07

Risque modélisé fort en lien avec période à risque

En Nord Aquitaine, le niveau de risque est toujours jugé fort par nos modèles. La pression maladie reste forte sur grappes même si elle semble infléchir sous 10jours. Sur feuilles, elle reste élevée. De nouvelles baies oïdiées ont été constatées par nos techniciens ce début de semaine secteur Guillac, St Genis du bois, St Germain du puch, en plus de celles déjà observées à Cadillac et Mouliets-et-Villemartin.



Les précédentes contaminations pourraient continuer à faire exprimer des symptômes sur feuilles et/ou baies. Des séries de contaminations plutôt secondaires sont décrites par le modèle jusqu'au 10/07.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	
St Emilion	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cussac	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cenac	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Pomerol	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Berson	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cazaugitat	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Preignac	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Baron	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							

En Sud Aquitaine, quelques baies de Gros Manseng et Chardonnay touchées par l'Oïdium continuent de progresser. Le risque est fort, même s'il tend à diminuer plus tôt qu'en Nord Aquitaine. Comme au Nord Aquitaine, des contaminations secondaires de plus ou moins fortes ampleurs sont toujours signalées.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	
Jurançon	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Maumusson	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Cazaubon	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Geaune	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							
Condom	Oïdium	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red							

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro



Suivez nous evv.fr

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

→ BLACK-ROT

Black-rot: Risque faible à moyen selon les pluies à venir

Tache foliaire avec picnides, baie touchée

Stade BBCH 75 à 79

Pluie potentielle du 06 au 09/07

Risque contamination du 06 au 10/07

En Nord Aquitaine,

Globalement, le Black-rot reste contenu, mais quelques parcelles expriment de nouvelles taches sur feuilles et surtout sur baies. Une situation explosive sur merlot secteur Langoiran, présente un niveau d'attaque élevé.



Actuellement, ces conditions météorologiques font évoluer le risque entre des niveaux faibles à moyen selon les secteurs et les probabilités de pluies.

La contamination décrite le 14/06 sur les secteurs les plus fortement arrosés, pourraient expliquer les sorties de taches sur feuilles et baies depuis ce lundi.

Suite aux précipitations du 19 au 23/06, l'incubation en cours pourraient faire exprimer des dégâts à partir de semaine prochaine.

Selon notre OAD, en prévisionnel, le modèle simule des contaminations le 06/07, selon les pluies reçues. Cela pourrait se traduire par des expressions de symptômes sur fin juillet.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	
St Emilion	Black-rot																			
Cussac	Black-rot																			
Cenac	Black-rot																			
Pomerol	Black-rot																			
Berson	Black-rot																			
Cazaugitat	Black-rot																			
Preignac	Black-rot																			
Baron	Black-rot																			

En Sud Aquitaine, le risque est quasi équivalent au Nord Aquitaine.

De nouvelles taches sur feuilles et quelques baies avec symptômes de Black-rot ont été signalés sur Madiran et surtout dans les Landes. Ces attaques pourraient correspondre aux potentielles contaminations autour du 08/06. Sous les pluies de la semaine dernière, des sorties pourraient apparaître dès le 12/07 au moins sur feuilles.

En prévisionnel et si pluies contaminatrices du 06 au 10/07, de nouveaux épisodes infectieux et des risques de repiquages sont possibles si présences de taches avec picnides dans la parcelle.

Risque contamination potentielle		23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	
Jurançon	Black-rot																			
Maumusson	Black-rot																			
Cazaubon	Black-rot																			
Geaune	Black-rot																			
Condom	Black-rot																			

→ BOTRYTIS

Botrytis: Risque moyen de contamination

Symptômes rares déjà présents

Stade BBCH 75 à 79

Pluie potentielle du 06 au 09/07

Risque moyen

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

NOUVEAU

Découvrez le site web EVV
evv.fr



Suivez nous

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Peu de nouveaux symptômes de botrytis sur baies constatés ce début de semaine, toutefois les anciens restent sporulants. Vu sur Sémillon en Vallée de Garonne et sur Chardonnay en Gascogne.



Les applications d'anti-botrytis biocontrôles ou de synthèses se poursuivent. Les dernières pluies orageuses ont pu être contaminantes.

Méthodes alternatives:

Une stratégie alternative à base de **Basfoliar Kelp** et d'**Invelop** permet de contenir le développement du botrytis. Des réductions d'attaque de Botrytis peuvent être obtenues par :

- Traitement contre les tordeuses,
- Enherbement permanent contrôlé,
- Effeillage de la zone des grappes,
- Protection anti-oïdium, mildiou
- Gestion de la fertilisation azotée,

Bien évidemment, toutes les mesures prophylactiques que constituent les levages ordonnés, l'aération de la zone des grappes, la limitation des entassements font parties intégrantes de la lutte contre le Botrytis.

→ GESTION DU VIGNOBLE

Les désherbages, épamprages manuels, chimiques ou mécaniques se réalisent.

Les levages sont en cours et devront être faits avant le renouvellement de la protection si les rameaux s'inclinent de trop. Il est impératif d'éviter les rameaux proches du sol ou ceux touchant le sol pendant les pluies.

Les effeuillages manuels ou thermiques se réalisent.

🕒 LE ROGNAGE

Rappel : Pour le rognage : agissez sans hâte, privilégiez un 1^{er} passage haut (évitiez de rogner proche du dernier fil, laissez une certaine hauteur permettant d'abaisser le rognage par la suite si nécessaire), cela permet de réduire les sorties d'entre-cœurs et les rognages latéraux et donc de limiter les blessures sur les grappes.

Avant application d'un traitement systémique:

Il est préférable de réaliser les écimages rognages quelques jours avant l'application car ce sont des opérations qui stressent la vigne et qui freinent la pénétration et le mode d'action des produits systémiques.

Après application :

Attendre le plus possible mais 5 à 6 jours après le traitement, les opérations de réduction de végétation sont possibles.

Préférer la première solution qui en plus permet une meilleure qualité d'application.

→ ARRACHAGE DOUBLEMENT PROLONGE POUR LES VIGNES BORDELAISES

La campagne bordelaise d'arrachage de vignes gagne un mois pour être réalisée en 2024 et pourra bien être reconduite avec un deuxième dispositif qui s'ouvre jusqu'en juin 2025.

En attendant que le dispositif national de réduction du potentiel viticole à 2 500 ou 4 000 €/ha soit entériné par l'Union Européenne (pour être effectif dès le 15 octobre, comme le réclame la filière vin), l'initiative bordelaise d'arrachage sanitaire à 6 000 €/ha se poursuit, avec deux évolutions majeures actées par l'arrêté du 21 juin actualisant les « modalités d'attribution et de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire de l'aide à l'arrachage sanitaire préventif dans le département de la Gironde ».

Pour la campagne d'arrachage lancée cet hiver, la date d'accomplissement des travaux déjà reportée du 31 mai au 30 juin va désormais être fixée « **au plus tard le 31 juillet 2024** » alors que les pluies répétées ont retardé les travaux d'arrachage.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

NOUVEAU

Découvrez le
site web EVV
evv.fr



Suivez nous 

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Comme annoncé par le député sortant Pascal Lavergne (Renaissance, Gironde), le financement du plan d'arrachage bordelais sera bien monté de 30 à 38 millions d'euros, conformément à l'engagement pris par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, afin de financer une **deuxième campagne d'arrachage** pour des vignobles arrachés et reconvertis en boisement ou zones naturelles/jachère sur 20 ans (l'enveloppe de 19 millions € de l'interprofession bordelaise ayant été consommée intégralement pour la diversification agricole). « Une nouvelle période de dépôts des demandes d'aides est ouverte à partir du 20 juin 2024. Les demandes pourront être déposées sur le site démarches-simplifiees.fr » annonce l'arrêté, précisant que « le dépôt des demandes d'aide sera clôturé dès que l'enveloppe budgétaire prévue sera entièrement consommée et au plus tard le 30 avril 2025 ». Cette deuxième vague d'arrachage doit être réalisée « au plus tard le 30 juin 2025 » ajoute le texte signé par les ministères de l'Agriculture et de l'Économie. Afin d'espérer gérer la réduction de la production de vins rouges actuellement frappés par la déconsommation, et alimentant l'abandon de vignes partant en friche dans tout le département.

→ QUALITE DE PULVERISATION

Le réglage du pulvérisateur se fait à poste fixe pour vérifier certains paramètres de fonctionnement de manière à connaître le volume de bouillie appliqué par hectare. Puis, au vignoble, pour adapter le réglage des diffuseurs à la végétation à traiter.

Rappel : Pour protéger efficacement la vigne, il faut:

Soigner sa pulvérisation, Adapter la cadence de traitements aux conditions de pression, aux pluies, aux durées d'humectation du végétal et à la pousse. Alternier les familles chimiques.

→ Note d'information destinée aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques

Une note, identifiant les points saillants de la réglementation applicable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en précisant les non-conformités susceptibles d'être constatées lors des contrôles, a été rédigée par le Service régional de l'Alimentation. Elle donne les informations sur les sanctions rattachées à chacune des infractions qui peuvent être relevées.

Consulter la note d'information utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques

<https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcv3suw.r.sp1-brevo.net%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfqq8dlR6SwNLTWfBFtlx8l%2FrgZerWzv-Yy3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnkno wn%7CTWfPbGZsb3d8evJWljoIMC4wLjAwMDAlCJQljoiv2luMzIilCJBtI6lk1haWwILCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGh4gecukU0ivnSQz7VMqVO3Lq%3D&reserved=0>

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies de la vigne 2024	https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/01/Note-technique-commune-vigne-2024-VDef.pdf
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://info.agriculture.gouv.fr/qedei/site/bo-agri/instruction-2024-128
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne n°15 : 03/07/2024 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

