FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

NORD AQUITAINE **Observations techniques Vigne N°12 – 11 Juin 2025**

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Nord Aquitaine (24, 33, 47). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.

L'ESSENTIEL

Risque faible — Risque moyen — Risque fort

Physiologie	Météo	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Botrytis	Tordeuses	Cicadelles	Nos OAD
BBCH 69 à 73	Temps chaud et orageux	Risque fort sous pluies d'orages,	Risque élevé,	Risque moyen, Nouvelles tâches foliaires	Risque moyen	Départ Vol G2,	PLO en cours,	Végétal Signals®, Weenat®, Movida Grapevision®

MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gironde (Artigues près Bordeaux)



Prévision Dordogne (Bergerac)



Cette semaine sera sous le signe de la chaleur et des orages. La semaine suivante pourrait être un copier/coller.

PHÉNOLOGIE

	Floraison	Nouaison	Grains de plomb	Grain de pois	Mi Fermeture	Fermeture complète	Début véraison
Global							

La croissance de la vigne progresse et la floraison s'achève. Les stades moyens vont de fin floraison à Grains de plombs, voire Grains de pois pour les parcelles les plus précoces. L'avancement de la floraison peut être hétérogène en intra-parcellaire ou sur un même pied. Et on peut noter des différences de fécondité selon les précocités. Quelques rougissements foliaires et phytotoxicités sont constatés. Sur des plantes en sol séchant, un léger stress hydrique commence à se faire ressentir.

AMELIORER LE RENDEMENT ET LA QUALITE:

Sécurisation rendement

Basfoliar® Kelp s'applique à la nouaison puis renouvelé 15 j plus tard ou peut s'utiliser aussi en 1 fois à 3l/ha en plein jusqu'au stade grains de pois. Les bénéfices produits sont maintenus c'est à dire le grossissement des baies (plasticité pelliculaire), élongation rafle et maintien des qualités organo leptiques.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Possible aussi de l'associer avec les anti botrytis en dirigé sur grappes mais à la dose de 2,5l/ha.

Stratégie nutriciteur

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

Stratégie plantation

Sur celles à venir, des biostimulants du type Basfoliar- Rhizo bio ou Acrecio, peuvent être appliqués afin de favoriser une bonne reprise du plant et un développement racinaire plus rapide.

Stress climatique



Si les réserves utiles en eau du sol, devenaient limitantes sur certains terroirs, l'évapotranspiration forte de la vigne pourrait générer des contraintes hydriques. Des applications foliaires, telles que l'approche **Prevax/Hydrostress®** ou **Megagreen®** sont à réfléchir par anticipation sur zones sensibles.
L'Invelop® ou Calsun® sont aussi recommandés pour créer une barrière physique et préventive, permettant de compléter la résistance des plantes face aux différents stress.
En conditions de **stress thermique**, liées aux fortes chaleurs, ces talcs ou Carbonate de calcium, permettent de diminuer la T°C à la surface des feuilles et des grappes et préservent la culture des coups de chaud et coups de soleil. Ces solutions limitent la présence de cicadelles et les dégâts sous-jacents.

Stratégie phytothérapie

Les produits de phytothérapie sélectionnés par EVV, à base de plantes terrestres, procurent une défense naturelle et une stimulation performante de la physiologie végétale. Certaines solutions, élaborées pour s'adapter aux exigences particulières de la vigne, associent une ou plusieurs plantes afin de conjuguer leurs avantages. En raison de leur haute teneur en composés actifs, elles fortifient les défenses naturelles de la vigne, améliorent leur résistance aux pathogènes fongiques et stimulent un développement sain et continu.

TORDEUSES

Nous arrivons sur le départ du vol de G2 d'Eudemis et Cochylis.
Chez EVV, les pièges ont été réinstallés fin de semaine dernière.
Toutes zones confondues, les glomérules ont été régulièrement observés par nos techniciens. Néanmoins, les niveaux de présences ont été faibles à moyens. Les parcelles confusées se sont globalement bien comportées avec peu ou pas de glomérules.
Des larves d'eudemis prédatées sont aussi notées. Les chrysopes, punaises, forficules, oiseaux, araignées, syrphes, chauves-souris en consomment. Certains parasitoïdes naturels comme les trichogrammes présentent une bonne action de régulation en s'attaquant aux pontes.
EXPLOYO Vit est une solution de confusion sexuelle liquide pour protéger le vignoble contre *Eudémis*.
A positionner au début des vols de G2 et/ou G3.

Si vous souhaitez participer à notre réseau de piégeage vers de grappes, faite nous le savoir

CICADELLES

Les cicadelles des grillures adultes sont actives et observées, parfois en nombres de St Germain du puch à Puisseguin. Les larves semblent avoir été régulées par le PLO. Des grillures sont visibles. Attention aux abeilles !

Stratégie lutte aménagée 2025 contre cicadelle de la Flavescence Dorée

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, la Zone Non Traitée (ZNT) en bordure d'un point d'eau est fixée à 3 mètres. Les autres ZNT et distances de sécurité (riverains, personnes vulnérables, personnes présentes) sont fixées à 0 mètre (en prenant soin d'éviter toute dérive). En cas de mélange avec un autre produit ou d'un dosage différent de celui indiqué ci-dessous afin de viser une autre cible, les ZNT et distances de sécurité sont à respecter en fonction de l'autre produit et/ou du dosage.
L'arrêté du 9 mai 2025, paru au JO du 13 mai, modifie l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur : https://agriconnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-Agriconnaissances/cobra-ocaapi/Documents/Abeille_et_pollinisation/Ab_Agir/ArreteAbeillesVigne2025.pdf

AUTRES RAVAGEURS

Les escargots restent présents dans les pieds mais n'ont plus une grosse activité.
Les cigariers sont régulièrement constatés.
Des cochenilles floconneuses de la vigne (Pulvinaria vitis) sont détectées sur quelques parcelles avec parfois de fortes infestations.
Ne pas confondre cicadelles vertes et cicadelles Italienne. Des larves d'Eulia sont observées.

Escargot

Cochenille

Cigare

Cigarier

Larve cicadelle italienne

Larve Eulia

AUXILIAIRES

Les auxiliaires sont bien présents.

Opilion

Araignée

Larve syrphe

Coccinelle

Larve coccinelle

Larve chrysope

MILDIOU

Mildiou: Risque de contamination primaire et secondaire sur chaque pluie à venir

Sortie de mildiou feuille et grappe, parcelle grêlée plus sensible	Stade BBCH 69 à 73	Pluies potentielle du 11 au 16/06	Risque modélisé fort

Sur les 7 derniers jours, la zone Nord Aquitaine a enregistré entre 02 et 06 mm de pluie.
Au vignoble, la situation est globalement maitrisée, même si lors des opérations de levages, des grappes anciennement atteintes se dévoilent. De nouveaux symptômes isolés apparaissent depuis mardi avec du rot-gris plutôt actif sur pointes de grappes et sur les capuchons floraux. De même, de nouvelles sorties sur feuilles sont constatées en Nord Médoc, ainsi que des repiquages sur feuilles et des reprises d'activité du Rot-gris sur le secteur Sauveterre et Cadillac (zones les plus arrosées et à risque plus fort).

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Facies mosaïque

Face inferieure

Sortie du 25/05

Rot gris

Sous les pluies orageuses du 19/05, les contaminations primaires et secondaires enregistrées, ont généré des symptômes sur feuilles et grappes ☑. Les averses du 21/05, ont, elles aussi, laissé sortir des tâches du 29/05 (feuilles) au 03/06 (grappe) ☑.
Sur les pluies du 01 au 05/06, même faibles, des contaminations primaires et secondaires pouvaient produire les symptômes observés ce début de semaine ☑.
En prèvisionnel, selon le modèle, sous chaque pluie et dès 2.5 mm, le risque sera présent pour les contaminations primaires et secondaires. Surveillez les potentielles pluies décrites le 16/06.

Evolution du Risque Mildiou	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6
St Christophe des Bardes								
Martillac								
Lamarque								
St Seurin de Cadourne								
Teuillac								
Pellegrue								
Omet								
Preignac								
Baron								
Pomport								

Au moins deux traitements préventifs dans les vignes plantées avec des cépages résistants
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_Note_technique_OSCAR_vf.pdf

OIDIUM

Oïdium: Risque de contamination surtout conidienne			
Stade floraison	Stade BBCH 69 à 73	Conta secondaires jusqu'au 16/06	Risque modélisé fort

L'observation d'Oïdium reste toujours faible. L'arrivée du stade grains de plomb est souvent propice aux premieres apparitions d'Oïdium sur baies (infection conidienne).
Le niveau de risque actuel est toujours jugé fort en cette phase végétative de forte sensibilité.
Selon le modèle, les événements contaminants se succédent, tous secteurs confondus. Les infections primaires issues d'ascospores semblent se tarir et les secondaires prendraient le relai. Des sporulations foliaires seraient attendus cette semaine.
Selon le modèle, d'autres contaminations secondaires se produiraient cette semaine.
Ce champignon n'affectionne pas l'eau sous forme liquide pour sa germination et son développement, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Son développement nécessite un taux d'humidité élevé et une luminosité faible. Le niveau de risque est jugé fort.

Evolution du RisqueOïdium	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6
St Christophe des Bardes								
Martillac								
Lamarque								
St Seurin de Cadourne								
Teuillac								
Pellegrue								
Omet								
Preignac								
Baron								
Pomport								

BLACK-ROT

Black-rot: Risque moyen			
Nouvelles tâches, picnides	Stade BBCH 69 à 73	Conta signalées les 12 et 14/06	Risque moyen en présence de picnides

Au vignoble, pas de nouvelle tâche constatée, toutefois sur nos TNT, voire sur vignes abandonnées, de nouveaux symptômes sur feuilles sont apparus depuis le 06/06 et ce mardi.
Sous les contaminations du 03 /05, l'expression de symptômes a été validée le 26/05 ☑.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Les précipitations du 10 et 11/05, si contaminatrices et sans protection, devaient faire apparaitre d'autres symptômes sur feuilles autour du 03/06 ☑ .
Sous les pluies contaminatrices du 19 voire 21/05, après incubation, la vigne devait exprimer d'autres affections vers le 10/06 ☑.
Les dernières pluies depuis dimanche 01/06 semblaient peu dangereuses et n' auraient pas eu la capacité à assurer du repiquage à partir des taches déjà existantes.
Au pire, des tâches foliaires, voire sur grappes pourraient subvenir vers le 22/06.

Evolution du Risque Black-rot	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6
St Christophe des Bardes								
Martillac								
Lamarque								
St Seurin de Cadourne								
Teuillac								
Pellegrue								
Omet								
Preignac								
Baron								
Pomport								

A partir du 12/06, avec les potentielles pluies orageuses, le risque va légèrement augmenter jusqu'à fin de semaine.
Des contaminations de faibles ampleurs ou repiquages, sont simulés les 12 et 14/06 sur la majorité des zones et pourraient générer des sorties de dégâts à partir du 03/07.

BOTRYTIS

Sur cette période critique qu'est la floraison, le modèle signale un risque faible de contamination jusqu'au 15/06. La zone Médoc ne serai pas concernée.
Le 1er risque d'infection va de l'allongement des inflorescences au stade du plombs de chasse. À ce stade, les infections, causées par des conidies, peuvent provoquer :

- la dessiccation de la grappe entière ou de quelques fleurs ;
- la colonisation saprophyte des résidus de floraison qui produiront par la suite de nouvelles conidies à l'intérieur des grappes et, potentiellement, de nouvelles infections au cours de la deuxième période, celle de la maturation ;
- et la colonisation latente des baies, qui se manifestera ensuite pendant la maturation si les conditions environnementales sont favorables.

GESTION DU VIGNOBLE

Sous le rang, le Ray-grass, les folles avoines ou avoine de semis et chiendent se développent et grainent. Epilobes, Erigerons et liserons croissent. Cette flore pousse rapidement à la faveur des conditions actuelles. De nouvelles germinations sont attendues suites aux précédentes précipitations.

Désherbage:

Rappel sur l'efficacité des herbicides foliaires chimiques systémiques.

- Appliquer la spécialité dans des conditions météorologiques optimales.
- Respecter les doses recommandées indiquées sur l'étiquette en fonction de l'espèce et du stade de développement de l'adventice à contrôler.
- Privilégier les stades jeunes ou en rattrapage au stade épiaison/floraison des adventices vivaces et graminées.

Lors de l'opération d'épamprage chimique, il convient de mettre tout en œuvre pour réduire la dérive des substances actives utilisées et éviter les brulures à cause des embruns de pulvérisation.
Attention à ne pas appliquer de glyphosate sur les pampres.
Les plantations se poursuivent.
Les épamprages dans les têtes et les épamprages bas des souches sont en cours ou se renouvellent.
Les levages se sont accélérés avec la pousse actives de ces derniers jours.

Attention aux rameaux retombant sources de contaminations lorsqu'ils touchent le sol et garants d'une mauvaise qualité de pulvérisation.
Vérifier qu'ils ne soient pas porteur de maladie (présente ou en incubation) avant de les replacer dans l'axe de palissage (foyers potentiels).

ECIMAGE – ROGNAGE avant application d'un traitement systémique:

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

- Il est préférable de réaliser les écimages rognages quelques jours avant l'application car ce sont des opérations qui stressent la vigne et qui freinent la pénétration et le mode d'action des produits systémiques.
- Après application ; attendre le plus possible (5 à 6 jours après le traitement) pour effectuer ces opérations de réduction de végétation (induit une perte de produit qui disparait avec la fraction du végétal supprimé).

Préférer la première solution qui permet une meilleure qualité d'application.

PRÉVENIR LE DÉVELOPPEMENT DES VIGNES NON CULTIVÉES:

Jeudi 5 juin 2025, le Sénat a adopté en séance plénière une proposition de loi instaurant un dispositif de sanction contre les propriétaires de vignes laissées à l'abandon.
https://www.senat.fr/rap/l24-646/l24-646-syn.pdf

SOLUTIONS EVV DE PILOTAGE AU VIGNOBLE

HYDROSCORE by VEGETAL SIGNALS®

A quoi ça sert ?

- Suivi en temps réel du statut hydrique de la vigne
- Historique de vos données
- Prise de notes dans l'application

Pourquoi faire ?

- Optimiser l'arrosage des jeunes vignes
- Positionnement des produits biostimulants
- Suivre l'impact de différents itinéraires techniques
- Accumuler de la donnée pour mieux comprendre le comportement de ses parcelles

REPORT DES DATES D'ARRACHAGES

Arrachage national dit « Ukraine » (4 000 €/ha) : la date limite de réalisation des travaux et des déclarations d'arrachage au CVI est reportée au 21 juillet 2025 (au lieu du 2 juin). La date limite de dépôt des demandes de paiement via le téléservice PAD est reportée au 22 juillet 2025 à 12h (au lieu du 3 juin).

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies vigne 2025	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
Renouvellement de votre Certiphyto	https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
Bienvenue sur mon reglage pulve	https://reglage-pulve.vignevin.com/#/
Aide à la réduction définitive du potentiel viticole	https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Aide-nationale-a-la-reduction-definitive-du-potentiel-viticole-suite-aux-consequences-de-l-agression-de-la-Russie-contre-l-Ukraine#:~:text=L%27aide%20nationale%20%C3%A0%20la,d%27une%20demande%20de%20paiement.
Surveillance des Organismes Réglementés et Emergents	Contact :DRAAF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse : ✉ *sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr*
note d'information utilisateurs de PPP	https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc3suw.r.sp1-brevo.net%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfgq8dIR6SwNLTWfBFtfLx8I%2FrgZerWzv-Yv3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGh4gecukU0ivnSQz7VMqVO3Lq%3D&reserved=0

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z