

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

SUD AQUITAINE Observations techniques Vigne N°14 – 25 Juin 2025

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Sud Aquitaine et Gascogne (32,40,64). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.



L'ESSENTIEL



Risque faible



Risque moyen




Risque fort

Physiologie	Météo	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Botrytis	Tordeuses	Cicadelles	Stress hydrique
BBCH 75 à 79	Temps chaud orageux	Risque conta 2aires sous pluies à venir, début Rot-brun	Risque élevé, nouvelle sortie feuille et baie	Risque faible, Pas de nouvelle tâche foliaire	Risque nul	Vol G2 en cours, ponte en cours, éclosion proche	Vol de G2 en cours,	A anticiper




MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gers (Eauze)



Prévision Pyrénées Atlantique (Uzein)



Les premiers orages ont débuté cette nuit mais sans pluie. D'autres précipitations sont attendues jusqu'au 26/07 puis le temps redevient chaud et sec. Un autre risque orageux est pressenti pour le 01/07. Attention aux risques de stress thermique.



PHÉNOLOGIE

Floraison	Nouaison	Grains de plomb	Grain de pois	Mi Fermeture	Fermeture complète	Début véraison
Global						

La croissance de la vigne et des grappes progressent bien. Les stades moyens vont de Grains de pois à fermeture complète pour les Chardonnay. Le niveau de coulure/millerandage est acceptable et en dessous de celui subit en 2024 et d'avantage constaté sur Chardonnay et Tannat. Les jeunes vignes commencent à stresser et le déclenchement de l'irrigation goutte à goutte va débuter. Des carences potassiques, magnésiennes et chloroses apparaissent. Quelques rougissements foliaires et phytotoxicités sont constatés. Le court noué est visible. Sur les premiers effeuillages, de l'échaudage est visibles.



AMELIORER LE RENDEMENT ET LA QUALITE:



Sécurisation rendement

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Basfoliar® Kelp s'applique à la nouaison puis renouvelé 15 j plus tard ou peut s'utiliser aussi en 1 fois à 3l/ha en plein jusqu'au stade grains de pois. Les bénéfices produits sont maintenus c'est à dire le grossissement des baies (plasticité pelliculaire), élongation rafle et maintien des qualités organo leptiques.

Possible aussi de l'associer avec les anti botrytis en dirigé sur grappes mais à la dose de 2,5l/ha.

► Stratégie nutriciteur

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

► Stress hydrique/thermique

La période de croissance des baies, est dû à la division cellulaire qui produit de nouvelles cellules et est assez sensible au stress hydrique. Les effets du stress à ce moment-là peuvent persister durant le reste de la saison. Cela peut provoquer une baisse du rendement mais cela peut être bénéfique pour une meilleures extraction des qualités organoleptiques dans des baies plus petites (rapport pellicule/volume plus élevé).

Supporter la charge des fruits est une épreuve pour les vignes. Ainsi, les vignes très chargées en fruits tendent à réagir plus sensiblement aux stress hydrique.

De plus, les vignes ne sont pas les seules plantes ayant besoin d'eau dans les vignobles.

Les mauvaises herbes et les couverts végétaux consomment aussi de l'eau et sont des éléments importants de l'équilibre hydrique des vignobles. Les vignes ne rivalisent pas très bien avec les adventices et les couverts puisque leurs systèmes racinaires sont d'une densité très faible (c'est-à-dire qu'elles ne développent pas beaucoup de racines par mètre cube de terre) par rapport aux autres plantes.

Facteurs aggravants du stress hydrique:

- Sols pauvres en réserve utile (sableux, graveleux, superficiels).
- Racines superficielles ou peu développées.
- Couverts végétaux mal gérés : concurrence excessive. Faucher la couverture herbeuse a, généralement, un effet limité et temporaire sur la quantité d'eau utilisée par le couvert ; cette pratique ne devrait pas s'inscrire dans une optique d'économie d'eau. La concurrence hydrique avec la vigne, diminue d'une façon marquée si et quand le couvert végète ou arrive en fin de cycle.
- Charges excessives (rendements élevés).
- Températures élevées et canicules répétées.
- Précipitations hivernales insuffisantes.
- Travail du sol profond inadapté.
- Densité de plantation trop élevée.




Figure 1 exemple modélisation stress hydrique St Seurin de Cadourne (33)

Si les réserves utiles en eau du sol, devenaient limitantes sur certains terroirs et l'évapotranspiration de la vigne devenait forte, en complément des pratiques culturales, des applications foliaires, telles que l'approche **Prevax/Hydrostress®** ou **Megagreen®** sont à réfléchir par anticipation sur zones sensibles. L'Invelop® ou Calsun® sont aussi recommandés pour créer une barrière physique et préventive, permettant de compléter la résistance des plantes face aux différents stress.

PREVAX® + HYDROSTRESS® La stratégie face au stress hydrique						
Stade phénologique	Boutons floraux séparés	Irrigation	Nouaison	Petits pois	Fermeture de la grappe	Véraison
Produits						
PREVAX 5 l/ha						
HYDROSTRESS 5 l/ha						

En conditions de **stress thermique**, liées aux fortes chaleurs, ces talcs ou Carbonate de calcium, permettent de diminuer la T°C à la surface des feuilles et des grappes et préservent la culture des coups de chaud et coups de soleil. Ces solutions limitent la présence de cicadelles et les dégâts sous-jacents.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !


EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

📌 Stratégie phytothérapie

Les produits de phytothérapie sélectionnés par EVV, à base de plantes terrestres, procurent une défense naturelle et une stimulation performante de la physiologie végétale. Certaines solutions, élaborées pour s'adapter aux exigences particulières de la vigne, associent une ou plusieurs plantes afin de conjuguer leurs avantages. En raison de leur haute teneur en composés actifs, elles fortifient les défenses naturelles de la vigne, améliorent leur résistance aux pathogènes fongiques et stimulent un développement sain et continu.



➔ TORDEUSES

Le départ du vol de G2 d'Eudemis est effectif mais décalé selon les zones. Il est erratique même à l'échelle de 2 pièges installés sur la même parcelle. Captures plus élevées zone Béarn. Des pontes sont constatées. 1^{ères} perforations observées mais sont-elles les premières de G2 d'eudemis ? Le cycle des Eudémis risque d'être perturbé par les températures élevées actuelles. Ces dernières peuvent hâter l'évolution des œufs, diminuant la durée de latence entre le dépôt de l'œuf et la naissance de la larve.



Néanmoins, des conditions de chaleur extrême pourraient nuire à la survie des œufs, et, dans des températures hors normes, même au vol des papillons. Le niveau d'hygrométrie est le facteur clé pour la survie des œufs, car les conditions climatiques peuvent être létales en asséchant les œufs si le taux d'hygrométrie reste en dessous de 60% pendant une période prolongée.

Ce n'est qu'en surveillant régulièrement les pontes que la stratégie tordeuses de cette G2 sera définie. Si nécessaire, les applications d'ovo-larvicide devront être mises en place du début des pontes et au plus tard au stade œuf tête noire.

Si vous optez pour une spécialité à base de Bacillus T (DIPEL également homologués en AB), la positionner avant les éclosions au stade « tête noire ».

Ces produits sont lessivables (20 mm) avec une persistance d'action variable de 8 à 10 jours (renouvellement : tous les 8-10j).

Les 1^{ères} applications insecticides de synthèses ou biocontrôles débuteraient cette semaine en secteurs précoces et à partir de la semaine suivante sur les autres secteurs.

EXPLOYO Vit est une solution de confusion sexuelle liquide pour protéger le vignoble contre Eudémis.

A positionner au début des vols de G2 et/ou G3.

Dans le cadre d'une lutte biologique à base de Trichogramme sur la G3, pensez dès à présent à commander les plaquettes.



➔ CICADELLES

Les cicadelles des grillures adultes sont actives parfois observées en grand nombre, signe du départ d'une nouvelle génération. A l'issue, les larves vont émerger prochainement ou sont déjà présentes. Des grillures sont par endroit, très marquées sur cépages rouges. Les premiers pyrèthres de synthèses génériques déjà appliqués, ont difficilement contrôlé les larves de cicadelles vertes quand populations élevées lors du traitement. A date et localement on peut observer 40 à 60% de feuilles occupées.

📌 Stratégie lutte aménagée 2025 contre cicadelle de la Flavescence Dorée

Dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, la Zone Non Traitée (ZNT) en bordure d'un point d'eau est fixée à 3 mètres. Les autres ZNT et distances de sécurité (riverains, personnes vulnérables, personnes présentes) sont fixées à 0 mètre (en prenant soin d'éviter toute dérive). En cas de mélange avec un autre produit ou d'un dosage différent de celui indiqué ci-dessous afin de viser une autre cible, les ZNT et distances de sécurité sont à respecter en fonction de l'autre produit et/ou du dosage.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

T1	du 7 juin au 16 juin	Terminé
T2	en conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 22 juin au 1 juillet en AB : 10 jours après le T1 soit du 17 juin au 26 juin	Prochainement En cours
T3	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère ou les vignes des communes suivantes : Auch, Castillon Debats, Eauze, Gondrin, Lannepax, Lectoure, Montréal, Mouchan, Preignan Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	Prochainement Sauf en AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.

Figure 2: Dates d'intervention fixées par la DRAAF Occitanie (source BSV occitanie):

Dates de traitements pour le département des Pyrénées-Atlantiques (hors secteur Jurançon)				
1. Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors Agriculture Biologique				
Classement des communes	3 TRAITEMENTS	2 + 10 TRAITEMENTS (PIEGAGE)	2 TRAITEMENTS	1+10 TRAITEMENTS (PIEGAGE)
T1 Larvicide	Du 2 juin au 8 juin	Du 2 juin au 15 juin		
T2 Larvicide		PAS DE T2		
T3 Adulticide	A la fin de la rémanence du produit soit environ 14 jours globalement, du 16 au 22 juin			

Secteur hors Jurançon : T2 possible

Dates de traitements pour le département des Pyrénées-Atlantiques Secteur Jurançon				
1. Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors Agriculture Biologique				
Classement des communes	3 TRAITEMENTS	2 + 10 TRAITEMENTS (PIEGAGE)	2 TRAITEMENTS	1+10 TRAITEMENTS (PIEGAGE)
T1 Larvicide	Du 16 juin au 22 juin	Du 16 juin au 29 juin		
T2 Larvicide	A la fin de la rémanence du produit soit environ 14 jours globalement, du 30 juin au 6 juillet			
T3 Adulticide	A la fin de la rémanence du produit soit environ 14 jours globalement, du 30 juin au 6 juillet			

Secteur Jurançon : T1 en cours

Figure 2 : Date traitement 64 (source BSV N.A)

→ AUTRES RAVAGEURS

Les escargots restent encore présents dans les pieds et sont toujours actifs en Armagnac.

Des cochenilles floconneuses de la vigne (*Pulvinaria vitis*) sont détectées sur quelques parcelles avec parfois de fortes infestations.

Ne pas confondre cicadelles vertes et cicadelles Italienne. Des foyers de Cicadelles pruneuses sont visibles. Des adultes de Malacosomes du Portugal sont régulièrement rencontrés.



→ AUXILIAIRES

Les chrysopes sont très présents et bénéfiques comme prédateurs naturels de divers insectes ravageurs. Les chrysopes s'attaquent aux chenilles, aux thrips, aux cochenilles et à d'autres insectes à corps mous nuisibles à la vigne. Les larves de chrysopes sont des prédateurs particulièrement efficaces. Les œufs sont nombreux.



→ MILDIOU

Mildiou: Risque faible puis en ↗ sous prochaines pluies

Sortie mildiou feuille et grappe, parcelle grêlée plus sensible

Stade BBCH 75 à 79

Risque contamination




Risque modélisé fort le 25/06

Sur les 7 derniers jours, la zone Sud Aquitaine a enregistré très peu de pluie.

Au vignoble, de nouvelles tâches de mildiou sont observées depuis le 19/06 avec localement des fréquences de sorties régulières et importantes. Décrochage de plus en plus marqué en Ugni blanc et Gros manseng en Gascogne et très grosse sortie feuilles/grappes Gros manseng sur Jurançon et rouges sur Bellocq.

Même sans pluie, ce phénomène s'observe sur la plupart des zones et les tâches sont visibles sur le haut du feuillage et entre-cœurs. Symptômes peu actifs à date. Les anciens symptômes semblent bloqués (Halo marron et feutrage grisâtre à l'intérieur). Sur grappes, du Rot-gris est apparu par foyers et le Rot-brun commence à apparaître.

Les contaminations signalées entre le 06 et le 09/06 ont fait émerger des symptômes autour du 13/06 ✓.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Sous les pluies, du 11 au 15/06, notamment le 12 et le 15/06, des contaminations majoritairement secondaires ont généré de nouvelles sorties de mildiou du 19 au 22/06 autant sur feuilles que sur grappes ☒.

En prévisionnel et selon le modèle, des pluies seraient annoncées le 25/06 et d'autres le 02/07 (à confirmer) et dès 2.5 mm, elles pourraient être contaminantes et feront passer ponctuellement le niveau de risque à fort.

Au moins deux traitements préventifs dans les vignes plantées avec des cépages résistants

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_Note_technique_OSCAR_vf.pdf

Evolution du Risque Mildiou	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7
Condom									
Eauze									
Nogaro									
Madiran									
Monein									
Bellocq									
Geaune									

→ OIDIUM

Oidium: Risque de contamination ces prochains jours

Stade sensibilité forte

Stade BBCH 75 à 79

Contaminations ces prochains jours

Risque modélisé fort hors Geaune, Bellocq



De nouveaux symptômes d'Oidium sont observés secteur Madiran et Armagnac sur feuille et grappe de Chardonnay. Localisé sur parcelle historiquement sensible, vigoureuse et dans des bas-fonds.

Le niveau de risque de l'oïdium est toujours jugé fort et le restera au moins jusqu'au 01/07 (excepté sur Geaune et Bellocq). Actuellement, la

dynamique du cycle infectieux est décrit comme étant en forte augmentation.

Les derniers événements contaminants significatifs ont pu se produire encore ce début de semaine (Condom risque plus bas et Bellocq, Geaune moins concernés).

Selon le modèle, les événements contaminants secondaires se succèdent selon les secteurs. Ce champignon pour son développement nécessite un taux d'humidité élevé et une luminosité faible (ciel couvert au moins le matin depuis le 22/06).

Evolution du Risque Oidium	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7
Condom									
Eauze									
Nogaro									
Madiran									
Monein									
Bellocq									
Geaune									

→ BLACK-ROT

Black-rot: Risque nul à faible

Ancienne Tâche feuille

Stade BBCH 75 à 79

A priori, Peu de risque conta à venir,

repiquage possible sous chaque pluie

Peu d'évolution ce début de semaine.

Les pluies du 06 au 09/06 si réelles et contaminantes, laisseraient exprimer des taches foliaires vers le 25/06.

Les pluies des 12 et 15/06, ont pu produire des contaminations avec une sortie attendue début juillet.

Le risque actuel et à venir serait faible, mais avec le peu de fiabilité des prévisions météo, il ne faudra pas le sous-estimer. La présence de picnides dans les taches foliaires, peut entrainer des repiquages vers les grappes à la moindre pluie.



Evolution du Risque Black-rot	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6	1/7
Condom									
Eauze									
Nogaro									
Madiran									
Monein									
Bellocq									
Geaune									

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

→ GESTION DU VIGNOBLE

Les levages et relevages s'accroissent avec la croissance active de la végétation. Les plantations de l'année devront être régulièrement arrosées. Les irrigations goutte à goutte débutent.

➤ ECIMAGE – ROGNAGE avant application d'un traitement systémique:

- Il est préférable de réaliser les écimages rognages quelques jours avant l'application car ce sont des opérations qui stressent la vigne et qui freinent la pénétration et le mode d'action des produits systémiques.
- Après application ; attendre le plus possible (5 à 6 jours après le traitement) pour effectuer ces opérations de réduction de végétation (induit une perte de produit qui disparaît avec la fraction du végétal supprimé).

Préférer la première solution qui permet une meilleure qualité d'application.

➤ EFFEUILLAGES:

Objectifs de l'effeuillage :

- Améliorer l'aération de la zone des grappes.
- Réduire les risques de maladies (botrytis, oïdium).
- Favoriser une meilleure exposition des grappes au soleil pour améliorer la maturation.
- Équilibrer la charge végétative.

Précautions à prendre :

- **Effeuillage précoce (floraison à nouaison) :**
 - Favorise l'épaississement de la pellicule des baies.
 - Risque limité de brûlure.
- **Effeuillage tardif (véraison ou plus tard) :**
 - Plus risqué, car les baies sont déjà sensibles aux coups de soleil.
- **Modération de l'intensité :**
 - Ne jamais enlever trop de feuilles d'un coup.
 - Privilégier un effeuillage modéré pour éviter une surexposition.
- **Côté d'effeuillage :**
 - Dans le Bordelais, il est recommandé de commencer par le **côté levant (est)** pour que les grappes bénéficient de la lumière du matin et soient moins exposées aux coups de soleil de l'après-midi.
 - Le côté couchant (ouest) peut être partiellement effeuillé selon les années.
- **Conditions climatiques :**
 - Éviter d'effeuiller brutalement en période de fortes chaleurs ou de canicule.
 - Tenir compte des prévisions météorologiques à court terme.
- **Adaptation au cépage et au millésime :**
 - Certains cépages comme le Merlot sont plus sensibles à la surexposition que le Cabernet Sauvignon.
 - Ajuster selon la vigueur de la vigne et la densité du feuillage.

Risques encourus :

- **Brûlures des baies (échaudage) :**
 - Lors d'une surexposition brutale, surtout en cas de canicule ou d'effeuillage trop tardif.
- **Stress hydrique aggravé :**
 - Moins de feuillage = plus d'évapotranspiration = risque accru en période sèche.
- **Blocage de la maturation :**
 - Si l'effeuillage est excessif, la photosynthèse peut être réduite, ralentissant la maturation des raisins.
- **Perte d'arômes et déséquilibre gustatif :**
 - Surexposition = montée des sucres trop rapide, perte d'acidité, développement de notes cuites ou confiturées.
- **Déséquilibre physiologique de la plante :**
 - Trop de défoliation peut affaiblir la vigne et impacter les réserves de l'année suivante.

Des applications d'Argile ou de Talc, limiteront les risques d'échaudage.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°14 : 25/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

