FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

NORD AQUITAINE **Observations techniques Vigne N°15 – 02 Juillet 2025**

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Nord Aquitaine (24, 33, 47). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.

L'ESSENTIEL

Risque faible — Risque moyen — Risque fort

Physiologie	Météo	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Botrytis	Tordeuses	Cicadelles	Stress hydrique
BBCH 75 à 79	Temps chaud orageux	Risque conta 2aires sous pluies à venir, sortie Rot-brun	Risque moyen, rare symptôme	Risque faible, présence sur grappe	Risque nul	Vol G2 en cours, ponte en cours, début perfo	Vol de G2 en cours, 1ère larve	A anticiper

MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gironde (Artigues près Bordeaux)



Prévision Dordogne (Bergerac)



Le retour des orages est attendu Mardi et mercredi soir (Dordogne) et fin de semaine ailleurs. Des précipitations sont pressenties du 05 au 07/07. Puis le temps redevient sec avec des T°c dans les normales de saison. Attention aux risques de stress thermique.

PHÉNOLOGIE

	Fin Floraison	Nouaison	Grains de plomb	Grain de pois	Mi Fermeture	Fermeture complète	Début véraison
Global							

La vigne continue de pousser mais sur les secteurs plus secs, la croissance est ralentie voire stoppée. Le stade des grappes progresse vite et la fermeture complète est quasi atteinte en secteur précoce. Sur des plantes de 2 à 3 ans, en sol séchant, le stress hydrique déjà constaté,se renforce. Les jaunissements du bas du feuillage et des crispations de feuilles sont d'avantage visibles.
Des carences potassique et/ou azotée sont observées. Des symptômes type manganiques sont visibles en médoc. De nouveaux symptômes d'Esca sont notés sur Cabernet. Des brûlures liées au soufre sont présentes.

AMELIORER LA QUALITE:

Stratégie nutriciteur

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de

renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

Stress hydrique/thermique

La période de croissance des baies est assez sensible au stress hydrique. Les effets du stress à ce moment-là peuvent persister durant le reste de la saison. Cela peut provoquer une baisse du rendement mais cela peut être bénéfique pour une meilleures extraction des qualités organoleptiques dans des baies plus petites (rapport pellicule/volume plus élevé).
De plus, les vignes ne sont pas les seules plantes ayant besoin d'eau dans les vignobles.
Les mauvaises herbes et les couverts végétaux consomment aussi de l'eau et sont des éléments importants de l'équilibre hydrique des vignobles.



Facteurs aggravants du stress hydrique:

- Sols pauvres en réserve utile (sableux, graveleux, superficiels).
- Racines superficielles ou peu développées.
- Couverts végétaux mal gérés : concurrence excessive.
- Charges excessives (rendements élevés).
- Températures élevées et canicules répétées.
- Travail du sol profond inadapté.

Si les réserves utiles en eau du sol, devenaient limitantes sur certains terroirs et l'évapotranspiration de la vigne devenait forte, en complément des pratiques culturales, des applications foliaires, telles que l'approche **Prevax/Hydrostress®** ou **Megagreen®** sont à réfléchir par anticipation sur zones sensibles.
L'Invelop® ou Calsun® sont aussi recommandés pour créer une barrière physique et préventive, permettant de compléter la résistance des plantes face aux différents stress.



En conditions de **stress thermique**, liées aux fortes chaleurs, ces talcs ou Carbonate de calcium, permettent de diminuer la T°C à la surface des feuilles et des grappes et préservent la culture des coups de chaud et coups de soleil. Ces solutions limitent la présence de cicadelles et les dégâts sous-jacents.

Stratégie phytothérapie

Les produits de phytothérapie sélectionnés par EVV, à base de plantes terrestres, à haute teneur en composés actifs, fortifient les défenses naturelles de la vigne face aux stress abiotiques, améliorent leur résistance aux pathogènes fongiques et stimulent un développement sain et continu.

TORDEUSES

Le vol de G2 d'Eudemis et Cochylis se poursuit. Il est faible et irrégulier. Selon les modèles, 85% du vol serait atteint.
Les fortes températures doivent perturber le vol. Des perforations isolées sont observées ce début de semaine sur la plupart des bassins viticoles.
Les pontes restent discrètes et les conditions de chaleur actuelles pourraient avoir réduit le dépôt et la survie des œufs.
Ce n'est qu'en surveillant régulièrement les pontes que la stratégie tordeuses de cette G2 sera définie. Si nécessaire, les applications d'ovo-larvicide devront être mises en place du début des pontes et au plus tard au stade œuf tête noire.
Si vous optez pour une spécialité à base de Bacillus T (DIPEL également homologués en AB), la positionner avant les éclosions au stade « tête noire ».
Ces produits sont lessivables (20 mm) avec une persistance d'action variable de 8 à 10 jours (renouvellement : tous les 8-10j).
Les 1ères applications insecticides de synthèses ou biocontrôles ont débuté fin de semaine dernière en secteurs précoces (Vallée de Garonne, Léognan) et cette fin de semaine sur les autres secteurs et après la canicule.
EXPLOYO Vit est une solution de confusion sexuelle liquide pour protéger le vignoble contre *Eudémis*.
A positionner au début des vols désormais de G3.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Dans le cadre d'une lutte biologique à base de Trichogramme sur la G3, pensez dès à présent à commander les plaquettes.

CICADELLES

Les cicadelles des grillures adultes sont actives et observées en grand nombre, signe d'une seconde génération en cours. Les larves de premiers stades apparaissent. Ne pas confondre cicadelles vertes et cicadelles Italienne.
À la mi-juillet, les Gdons devraient installer des pièges dans les zones en 1+1.
Des relevés sont prévus pour une durée de trois semaines. Si des seuils limites sont détectés, une alerte du GDON sera transmise.
L'inspection du vignoble pour détecter les plants affectés par la Flavescence Dorée commencera aux alentours du 4 août.

AUTRES RAVAGEURS

L'Erinose est de retour et visible sur le haut du feuillage et les entre-cœurs.
Des cochenilles floconneuses de la vigne (Pulvinaria vitis) sont détectées sur quelques parcelles avec parfois de fortes colonies. Les larves de seconde génération commencent à migrer sur les rameaux avant de finir par piquer la plante puis s'enkyster.
Des foyers de Cicadelles pruineuses sont visibles. Des adultes de Malacosomes du Portugal sont régulièrement rencontrés.

Ooplaque punaise diabolique

Gribouri

Galle phyloxérique

Erinose

Metcalfa pruinosa

Cochenille lécanide

Malacosome

Larve cicadelle grillure

Larve cicadelle italienne

Larve Eulia

AUXILIAIRES

Les chrysopes sont toujours très actifs. Les œufs sont nombreux. Les typhlodromes sont présents.

Chrysope

Larve chrysope

Oeuf chrysope

Opilion

Coccinelle

Larve coccinelle

Typhlodrome

MILDIOU

Mildiou: Risque de contamination secondaire sur pluie à venir

Sortie de mildiou feuille et grappe,	Stade BBCH 75 à 79	Pluies probables dès 05/07	Risque modélisé moyen sous pluies

Sur les 7 derniers jours, sur la zone Nord Aquitaine les pluies enregistrées se sont majoritairement concentrées sur le nord Médoc et Blayais. Ailleurs elles ont été nulles ou insignifiantes.
Au vignoble, la situation est globalement maitrisée, même si après les sorties foliaires du 22/06, de nouveaux symptômes sont apparus plus régulièrement depuis le 27/06 sur jeunes feuilles et entre-cœurs. Paradoxalement, avec ces conditions très chaudes, ce mildiou est très actif et avec parfois des sporulations abondantes. Les symptômes plus anciens sont en cours de dessechement.

Sortie du 19/06

Sporulation

Rot brun

Rot gris

Le rot-gris déjà présent reste plutôt actif sur pointes de grappes. Le rot brun progresse légèrement, mais parfois avec fulgurance sur Merlot et d'avantage sur certaines parcelles conduites en AB.
Les conditions météo de juin ont pu être propices au mildiou, via une combinaison température, humidité et pluies adaptées au pathogène.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°15 : 02/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Cette météo renforce l'hypothèse que, malgré une protection phytosanitaire, la croissance rapide des grappes, conjuguée au potentiel lessivage des traitements et à des conditions climatiques favorables, a pu permettre des contaminations, surtout sur les jeunes baies.
la croissance rapide des baies après nouaison, combinée à l'inefficacité partielle des produits de contact sur les parties nouvellement formées, a contribué à une protection incomplète, ouvrant par endroit, la voie à une pression mildiou plus forte en juin.
Sur les pluies du 01 au 05/06, même faibles, des contaminations primaires et secondaires pouvaient produire les symptômes observés autour du 11/06 ☑.

Evolution du Risque Mildiou	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

Sous les pluies orageuses du 13 - 15/06, les contaminations primaires et secondaires enregistrées, risquaient de générer des symptômes sur feuilles à partir du 19/06 ☑ . Sur grappes constaté depuis le 24/06 ☑.
Sur les pluies du 25/06, même faibles, les contaminations secondaires détectées, pourraient produire des sorties de symptômes vers le 01/07 sur feuille et à la suite sur grappes.
En prèvisionnel, selon le modèle, le risque dépendra des potentielles pluies décrites le 02/07 en Dordogne, voire de celles du 06-07/07. L'indice d'infection qui exprime la gravité relative de l'infection secondaire serait faible à nul sous les pluies du 02/07. A Surveiller les annonces de contaminations prédites du 05 au 08/07.
Dès 2.5 mm, des contaminations secondaires sont modélisées. Même si absence de maladie dans la parcelle, les spores volent et peuvent arriver de l'extérieur. Même si la sensibilité commence à baisser, attention aux attaques sur grappes.

OIDIUM

Oïdium: Risque de contamination toujours présent

Début symptôme feuille et baie	Stade BBCH 75 à 79	Conta secondaires jusqu'au 08/07	Risque modélisé en ↘

Dans notre réseau de suivi, pas de nouveau signalement d'Oïdium, hormi ceux déjà observés qui n'ont pas évolué. Les stades phénologiques actuels font que la sensibilité des baies diminue vis-à-vis de l'Oïdium.

Le niveau de risque actuel est jugé moyen.
Selon le modèle, les événements contaminants secondaires sont toujours d'actualité, tous secteurs confondus. Le risque tendrait à baisser avec les prochaines pluies mais repartirait légèrement à la hausse à l'issue secteur sud Gironde. Ce champignon pour son développement nécessite un taux d'humidité élevé et une luminosité faible (brouillard matinaux observés vendredi dernier).

Evolution du Risque Oïdium	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

BLACK-ROT

Black-rot: Risque à priori faible

Nouveau symptome grappe	Stade BBCH 75 à 79	Possibilité Conta par repiquage	Risque faible à moyen selon pluie

Au vignoble, quelques cas isolés de nouvelles grappes atteintes, par contre sur nos TNT une sortie massive sur grappes est observée depuis le 24/06.

Les pluies du 02/06 peuvent expliquer les sorties de symptômes foliaires du 17/06 ☑. A la suite, des symptômes sur baies devaient encore émerger vers le 24/06 ☑.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Suites aux pluies autour du 14/06, des contaminations de faibles ampleurs ou repiquages ont été signalés et pourraient générer des sorties de dégâts à partir du 03/07. En prévision et selon le modèle, le risque paraît faible et même avec les pluies à venir, aucune contamination nouvelle n'est décrite, excepté des repiquages issus de feuilles déjà infectées.

Evolution du Risque Black-rot	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

GESTION DU VIGNOBLE

Les levages et relevages s'accélèrent avec la croissance active de la végétation
Les plantations de l'année doivent être régulièrement arrosées.

ECIMAGE – ROGNAGE avant application d'un traitement systémique:

- Il est préférable de réaliser les écimages rognages quelques jours avant l'application car ce sont des opérations qui stressent la vigne et qui freinent la pénétration et le mode d'action des produits systémiques.
- Après application ; attendre le plus possible (5 à 6 jours après le traitement) pour effectuer ces opérations de réduction de végétation (induit une perte de produit qui disparait avec la fraction du végétal supprimé).

Préférer la première solution qui permet une meilleure qualité d'application.

EFFEUILLAGE:

Objectifs de l'effeuillage :

- Améliorer l'aération de la zone des grappes.
- Réduire les risques de maladies (botrytis, oïdium).
- Favoriser une meilleure exposition des grappes au soleil pour améliorer la maturation.
- Équilibrer la charge végétative.

Précautions à prendre :

- **Effeuillage précoce (floraison à nouaison) :**
  - Favorise l'épaississement de la pellicule des baies.
  - Risque limité de brûlure.
- **Effeuillage tardif (véraison ou plus tard) :**
  - Plus risqué, car les baies sont déjà sensibles aux coups de soleil.
- **Modération de l'intensité :**
  - Ne jamais enlever trop de feuilles d'un coup.
  - Privilégier un effeuillage modéré pour éviter une surexposition.
- **Côté d'effeuillage :**
  - Dans le Bordelais, il est recommandé de commencer par le **côté levant (est)** pour que les grappes bénéficient de la lumière du matin et soient moins exposées aux coups de soleil de l'après-midi.
  - Le côté couchant (ouest) peut être partiellement effeuillé selon les années.
- **Conditions climatiques :**
  - Éviter d'effeuiller brutalement en période de fortes chaleurs ou de canicule.
  - Tenir compte des prévisions météorologiques à court terme.
- **Adaptation au cépage et au millésime :**
  - Certains cépages comme le Merlot sont plus sensibles à la surexposition que le Cabernet Sauvignon.
  - Ajuster selon la vigueur de la vigne et la densité du feuillage.

Risques encourus :

- **Brûlures des baies (échaudage) :**
  - Lors d'une surexposition brutale, surtout en cas de canicule ou d'effeuillage trop tardif.
- **Stress hydrique aggravé :**
  - Moins de feuillage = plus d'évapotranspiration = risque accru en période sèche.
- **Blocage de la maturation :**
  - Si l'effeuillage est excessif, la photosynthèse peut être réduite, ralentissant la maturation des raisins.
- **Perte d'arômes et déséquilibre gustatif :**

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°15 : 02/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

- Surexposition = montée des sucres trop rapide, perte d'acidité, développement de notes cuites ou confiturées.
- **Déséquilibre physiologique de la plante :**
  - Trop de défoliation peut affaiblir la vigne et impacter les réserves de l'année suivante.

Des applications d'Argile ou de Talc, limiteront les risques d'échaudage.

SOLUTIONS EVV DE PILOTAGE AU VIGNOBLE

HYDROSCORE by VEGETAL SIGNALS®

A quoi ça sert ?

- Suivi en temps réel du statut hydrique de la vigne
- Historique de vos données
- Prise de notes dans l'application

Pourquoi faire ?

- Optimiser l'arrosage des jeunes vignes
- Positionnement des produits biostimulants
- Suivre l'impact de différents itinéraires techniques
- Accumuler de la donnée pour mieux comprendre le comportement de ses parcelles

REPORT DES DATES D'ARRACHAGES

Arrachage national dit « Ukraine » (4 000 €/ha) : la date limite de réalisation des travaux et des déclarations d'arrachage au CVI est reportée au 21 juillet 2025 (au lieu du 2 juin). La date limite de dépôt des demandes de paiement via le téléservice PAD est reportée au 22 juillet 2025 à 12h (au lieu du 3 juin).

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies vigne 2025	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
Renouvellement de votre Certiphyto	https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
Bienvenue sur mon reglage pulve	https://reglage-pulve.vignevin.com/#/
Aide à la réduction définitive du potentiel viticole	https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Aide-nationale-a-la-reduction-definitive-du-potentiel-viticole-suite-aux-consequences-de-l-agression-de-la-Russie-contre-l-Ukraine#:~:text=L%27aide%20nationale%20%C3%A0%20la,d%27une%20demande%20de%20paiement.
Surveillance des Organismes Réglementés et Emergents	Contact :DRAAF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse : ✉ *sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr*
note d'information utilisateurs de PPP	https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc3suw.r.sp1-brevo.net%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfgq8dIR6SwNLTWfBFtfLx8I%2FrgZerWzv-Yv3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGh4gecukU0ivnSQz7VMqVO3Lg%3D&reserved=0

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z