

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

NORD AQUITAINE Observations techniques Vigne N°17 – 16 Juillet 2025

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Nord Aquitaine (24, 33, 47). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.



L'ESSENTIEL



Risque faible



Risque moyen




Risque fort

Physiologie	Météo	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Botrytis	Tordeuses	Cicadelles	Stress hydrique
BBCH 77 à 81	Temps chaud orageux vendredi	Risque contamination sous pluies à venir,	Risque faible, rare symptôme	Risque de faibles contaminations,	Risque nul	Fin Vol G2, larve + perfo visibles	Larve en ↗	A anticiper




MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gironde (Artigues près Bordeaux)



Prévision Dordogne (Bergerac)



Les températures vont être de saison avec un pic de chaleurs attendu dès jeudi. Des averses orageuses sont pressenties les 18 et 19/07, voire le 21. Puis le temps redeviendra sec avec des T°C en dessous des normales de saison. Surveillez les risques de stress hydrique.



PHÉNOLOGIE

Fin Floraison	Nouaison	Grains de plomb	Grain de pois	Mi Fermeture	Fermeture complète	Début véraison
Global						

En moyenne, la vigne est au stade fermeture complète à premières baies vérees. Selon, l'évolution théorique des stades phénologiques, le début véraison aurait dû être plus présent. Des hypothèses de blocages peuvent expliquer ce retard. Paradoxalement, les 1ères baies vérees sont constatées sur terroirs normalement moins précoces mais dont les réserves hydriques sont moins limitantes. Des dessechements, jaunissements foliaires plus nombreux sont constatés et très marqués en sols filtrants et de graves. Les plantations peuvent être en souffrances si non arrosées, tout comme les complants. Symptômes d'Esca apoplectiques en hausses. La croissance des entre-cœurs se bloque; surveillez les débuts de stress hydriques sur parcelle sensible. Des carences K, Mg, Mn sont présentes.



AMELIORER LA QUALITE:

Stratégie nutriceur

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°17 : 16/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

👉 Azote foliaire à la véraison

Le tout début véraison est noté. Les stades pour l'application d'Azote foliaire sont imminents.

Gain en azote assimilable en fonction de la quantité d'azote foliaire apportée.

Gain en thiols variétaux dans les vins après pulvérisation d'azote-soufre

Traiter lorsque la véraison est engagée (20%) puis 10-15 jours après.

Mouiller le feuillage 200 à 400 litres par hectare

Azofol® Dose 25l/ha

Orgasève N+®  Dose : 4 L/ha

Geodyn® N109®  Dose : 5 à 10 l/ha

Geodyn® NS®  Dose : 3 à 6 l/ha

👉 Stress hydrique/thermique

La période de croissance des baies est assez sensible au stress hydrique. Les effets du stress à ce moment-là peuvent persister durant le reste de la saison. Cela peut provoquer une baisse du rendement mais cela peut être bénéfique pour une meilleure extraction des qualités organoleptiques dans des baies plus petites (rapport pellicule/volume plus élevé). Si les réserves utiles en eau du sol, devenaient limitantes sur certains terroirs et l'évapotranspiration de la vigne devenait forte, en complément des pratiques culturales, des applications foliaires de **Megagreen®** sont à réfléchir par anticipation sur zones sensibles.

L'Invelop® ou Calsun® sont aussi recommandés pour créer une barrière physique et préventive, permettant de compléter la résistance des plantes face aux différents stress.

En conditions de **stress thermique**, liées aux fortes chaleurs, ces talcs ou Carbonate de calcium, permettent de diminuer la T°C à la surface des feuilles et des grappes et préservent la culture des coups de chaud et coups de soleil. Ces solutions limitent la présence de cicadelles et les dégâts sous-jacents.

👉 Stratégie phytothérapie

Les produits de phytothérapie sélectionnés par EVV, à base de plantes terrestres, à haute teneur en composés actifs, fortifient les défenses naturelles de la vigne face aux stress abiotiques et stimulent un développement sain et continu.

👉 Régulation de la maturation et de la coloration pour les cépages rouges

Application du Sierra® entre les stades 15% et 30% de la véraison.

Dose recommandée : 2 l/ha en traitement dirigé sur la zone fructifère ou 2,5 l/ha en traitement de couverture générale. Utiliser le produit seul à 100 à 200 l/ha.

Avant de déclencher une intervention, il conviendra de suivre en pratique la procédure suivante :

- Vérification que toutes les grappes de la fructification destinées à la vendange aient atteint le stade optimum.
- **Ne pas intervenir sur une vigne stressée.**
- **Respecter un délai de 8 jours après un traitement cuprique pour appliquer SIERRA®.**
- **Appliquer SIERRA® avant rognage ou respecter un délai de 8 jours après un rognage.**

Sierra® : Fin commercialisation réglementaire : 31/07/2025 Fin d'utilisation : 31/07/2026

➔ **TORDEUSES**

Le vol de G2 d'Eudemis et Cochylis est terminé. Il aura été faible, de courte durée, irrégulier et perturbé par les fortes températures. Les pontes ont été discrètes et parfois avortées. Les larves semblent avoir eu un stade baladeur très court d'où des perforations isolées. Les larves observées vont des stades L2 à L5 avec en moyenne L3 et L4. Le maximum de dégâts observés est de 40% de perforations sur une parcelle non traitée et historiquement sensible.

EXPLOYO Vit est une solution de confusion sexuelle liquide pour protéger le vignoble contre Eudémis.

A positionner au début des vols désormais de G3, qui pourrait débuter autour du 24/07.

Dans le cadre d'une lutte biologique à base de Trichogramme sur la G3, pensez dès à présent à commander les plaquettes.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°17 : 16/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

→ CICADELLES

Les larves de cicadelles vertes sont présentes et les niveaux de populations augmentent. Les seuils de présences observés vont de 30% à 100% de feuilles occupées. Ne pas confondre cicadelles vertes et cicadelles Italienne.

Le Gdon des Bordeaux a communiqué. Dernier traitement insecticide entre le 15 juillet et le 17 août.


Communes à 1+1 traitements : à la suite des relevés de pièges, vous pourrez consulter les résultats sur le site internet pour savoir si vous devez traiter (mises à jour les vendredis 25 juillet, 1er et 8 août).

→ AUTRES RAVAGEURS

L'Erinose est de retour et visible sur le haut du feuillage et les entre-cœurs.

Des larves de cochenilles floconneuses de la vigne (*Pulvinaria vitis*) sont en train de migrer sur les rameaux.

Des foyers de Cicadelles pruineuses sont visibles. Des adultes de Malacosomes du Portugal sont régulièrement rencontrés.



→ AUXILIAIRES

Les chrysopes sont toujours très actifs. Les œufs sont nombreux.

Les typhlodromes sont présents.



→ MILDIOU

Mildiou: Risque de contamination sur pluie à venir

Peu de nouvelle sortie feuille et grappe,

Stade BBCH 77 à 81

Risque averses 18 et 21/07

Risque présent sous pluies

Sur les 7 derniers jours, sur la zone Nord Aquitaine les rares pluies enregistrées se sont majoritairement concentrées le 12/07. Les cumuls vont de 0 à 60 mm (localisé sur St Christophe de Double, Landerrouat, Massugas et Caplong).

Au-delà des averses, les rosées matinales constatées depuis dimanche peuvent aussi entretenir le Mildiou.

Au vignoble, la situation est globalement maîtrisée. Quelques nouveaux symptômes sont apparus sur feuilles. Du mildiou de type facies mosaïque commence à être constaté. Les anciens symptômes sur grappes sont quasi secs. Mais il n'est pas rare de voir encore du rot brun se propager sur quelques bouquets de baies.

Les averses des 06 et 07/07, si non couvertes, pourraient laisser s'exprimer, au moins, des taches foliaires à partir du 13/07 ✓.

Sous les pluies du 12/07, le modèle indique que dès 3 mm, des contaminations ont pu se produire. Sans protection, les sorties de symptômes pourraient être effectives dès le 18/07 au moins sur feuilles.

En prévisionnel, selon le modèle, le risque dépendra des potentielles pluies décrites entre le 18 et 22/07. L'indice d'infection serait significatif et le risque existera dès 3 mm si ces pluies se confirment.

Même si la sensibilité sur baie diminue, attention aux contaminations sur feuilles.

Evolution du Risque Mildiou	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°17 : 16/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

→ OÏDIUM

Oïdium: Risque de contamination toujours présent au moins sur feuille

Peu de nouveau symptôme
feuille et baie

Stade BBCH 77 à 81

Conta secondaires sur feuille

Risque modélisé en ↘

Dans notre réseau de suivi, quelques baies contaminées sont observées secteur Puisseguin.

Les stades phénologiques actuels font que la sensibilité des baies diminue vis-à-vis de l'Oïdium.

Le niveau de risque actuel est jugé moyennement faible.

Selon le modèle, des événements contaminants secondaires sont toujours d'actualité sur feuilles, mais faibles.

Evolution du Risque Oïdium	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

→ BLACK-ROT

Black-rot: Risque présent sous prochaines pluies

Pas de nouveau symptôme

Stade BBCH 77 à 81

sortie en attente vers le 21/07?

Baisse sensibilité grappe

Au vignoble, pas de nouvelle sortie de symptôme.

Sous les pluies du 25/06 si effectives, des symptômes sur baies pouvaient apparaître dès ce 13/07 ?.

Sous les averses du 06 et 07/07, de faibles contaminations conidiennes auraient pu se produire secteurs Pellegrue, Omet, Preignac, Pomport et de potentiels dégâts pourraient se produire vers le 21/07.

Les secteurs ayant reçu de l'eau le 12/07, pourraient avoir subi des contaminations. Une extériorisation de symptômes serait attendue vers le 26/07.

En prévision, selon le modèle et selon les futures potentielles pluies du 18 au 21/07, un léger risque est décrit. La sensibilité grappe diminue mais persiste jusqu'au début de la véraison, notamment sur parcelles présentant déjà des symptômes.

Evolution du Risque Black-rot	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7
St Christophe des Bardes									
Martillac									
Lamarque									
St Seurin de Cadourne									
Teuillac									
Pellegrue									
Omet									
Preignac									
Baron									
Pomport									

→ GESTION DU VIGNOBLE

Les plantations de l'année doivent être régulièrement arrosées.

➤ EFFEUILLAGES :

Risques encourus :

- **Brûlures des baies (échaudage) :**
 - Lors d'une surexposition brutale, surtout en cas de canicule ou d'effeuillage trop tardif.
- **Stress hydrique aggravé :**
 - Moins de feuillage = plus d'évapotranspiration = risque accru en période sèche.
- **Blocage de la maturation :**
 - Si l'effeuillage est excessif, la photosynthèse peut être réduite, ralentissant la maturation des raisins.
- **Perte d'arômes et déséquilibre gustatif :**
 - Surexposition = montée des sucres trop rapide, perte d'acidité, développement de notes cuites ou confiturrées.
- **Déséquilibre physiologique de la plante :**
 - Trop de défoliation peut affaiblir la vigne et impacter les réserves de l'année suivante.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°17 : 16/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Des applications d'Argile ou de Talc, limiteront les risques d'échaudage.

→ ENGRAIS VERTS

La période de semis des engrais vert pourra débuter dès fin Aout. C'est pourquoi, cette technique demande de l'anticipation dans sa mise en œuvre. Le travail du sol de l'inter-rang à semer pourra débuter dès fin juillet-début aout (disque, cultivateur) de façon à n'avoir qu'un passage de herse superficiel à réaliser en combiné ou juste avant semis. Nos plateformes engrais verts mettent en avant qu'un semis avant vendange assure une bonne installation du couvert et le passage des vendangeuses, n'altère pas ou peu le semis.

Le choix des espèces ou des mélanges doit être raisonné en fonction des objectifs attendus.

L'anticipation des réservations de semences est conseillée.

→ REPORT DES DATES D'ARRACHAGES

Arrachage national dit « Ukraine » (4 000 €/ha) : la date limite de réalisation des travaux et des déclarations d'arrachage au CVI est reportée au 21 juillet 2025 (au lieu du 2 juin). La date limite de dépôt des demandes de paiement via le téléservice PAD est reportée au 22 juillet 2025 à 12h (au lieu du 3 juin).

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies vigne 2025	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole
Renouvellement de votre Certiphyto	https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
Bienvenue sur mon réglage pulvé	https://reglage-pulve.vignevin.com/#/
Aide à la réduction définitive du potentiel viticole	https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Aide-nationale-a-la-reduction-definitive-du-potentiel-viticole-suite-aux-consequences-de-l-agression-de-la-Russie-contre-l-Ukraine#:~:text=L%27aide%20nationale%20%C3%A0%20la,d%27une%20demande%20de%20paiement.
Surveillance des Organismes Réglementés et Emergents	Contact :DRAAF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse :  sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
note d'information utilisateurs de PPP	https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc3suw.r.sp1-brevevo.net%2Fmk%2Fcl%2Fsh%2F6rqJfg8dlR6SwNLTWBFtlx8l%2FrgZerWzv-Yv3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWlloiMC4wLjAwMDAilCjQlloiV2luMzIlCjBtIl6lk1haWwIlCjXVCi6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGH4qecukU0ivnSQz7VMqVO3Lq%3D&reserved=0

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez

<http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Nord Aquitaine n°17 : 16/07/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro