

BOROZINC

CE Engrais Règlement 2019/1009

Precision
technologies



Produit utilisable en agriculture biologique en application
des RCE n°2018/848 et 2021/1165

AGRONUTRITION
by DSG

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
5%					
B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
13%			4%		



Données en g/L pour produits liquides

Caractéristiques

CONDITIONNEMENT

10 kg

CONSERVATION

36 mois

FORME

Poudre soluble (SP)

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et sec.

FORMULATION

Complexe pH acidifiant

APPLICATION

Foliaire (poudre)

Intérêts agronomiques

ROLES DES ELEMENTS

Bore :
- Rôle sur la fécondation - nouaison
- Migration des sucres
- Synthèse des protéines
- Activité méristématique et croissance
- Utilisation des auxines dans la plante

Zinc :
- Synthèse des hormones de croissance
- Fonctionnement enzymatique
- Synthèse des protéines

INTÉRÊTS DU PRODUIT

BOROZINC prévient les déficiences en Bore et/ou en Zinc.

BOROZINC est idéalement formulé pour les arbres fruitiers sensibles aux éléments Bore et Zinc.

BOROZINC est un produit « non russetant ». Sa formulation particulièrement douce le rend utilisable en période sensible d'application, période qui correspond à une forte croissance et à des besoins importants.

La sélection rigoureuse des matières premières utilisées dans BOROZINC lui garantit une solubilité à 100% et une dissolution très rapide dans la bouillie de traitement.

INTÉRÊTS DE LA FORMULATION

Base Acidifiante pH actif = Complexant Organique et Tamponnant

- Pénétration optimale et rapide des éléments. Taux d'absorption proche de 100 %
- Meilleure affinité de la bouillie acide avec la cuticule végétale
- Pas de précipitation des éléments sur le Calcium de l'eau (insolubilisation)
- Très compatible avec la plupart des produits phytosanitaires
- Acidifie et stabilise le pH (pouvoir tampon)
- Solubilise des éléments nutritifs présents dans la feuille
- Particulièrement recommandé dans le cas d'une eau dure et/ou calcaire

Mode d'emploi

RECOMMANDATION PAR CULTURE

APPLICATION FOLIAIRE

> **ARBRES FRUITIERS** (fruits à noyaux, fruits à pépins) - Dose : 2kg/ha - Concentration maximale : 1%
- Stade : D apparition des boutons floraux - E sépales visibles - E2/F1 début floraison - G/H chute des pétales - I nouaison
- Mise en réserve d'automne - Doses : 4 kg/ha - Concentration maximale : 2% - Stade : intervenir 2-3 semaines après récolte, avant la chute des feuilles

> **VIGNE, OLIVIERS** - Dose : 2 kg/ha - Concentration maximale : 0,5% - Stade : grappes visibles - boutons floraux - post floraison
- Mise en réserve d'automne - Doses : 4 kg/ha - Concentration maximale : 2% - Stade : après vendange

> **GRANDES CULTURES** (maïs, betteraves, tournesol...) - Dose : 3 kg/ha - Concentration maximale : 1% - Stade : 1 à 2 interventions sur feuillage suffisamment développé

> **CULTURES MARAICHÈRES*** - Dose : 3 kg/ha - Concentration maximale : 0,5 % - Stade : 1 à 2 interventions sur feuillage suffisamment développé

* Pour les cultures sous abri, procéder à un essai préalable (concentration maxi 0,3 %) pour observer le comportement de la végétation.

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau/ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur le feuillage. Préférer les traitements aux températures entre 6 et 25°C. Évitez les applications en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues. Verser progressivement le produit à travers un filtre, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de l'application. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

Précautions

- DANGER - Contient OCTABORATE DE DISODIUM TETRAHYDRATE, SULFATE DE ZINC (MONO-, HEXA- ET HEPTAHYDRATE) - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H360FD : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Pour un usage professionnel uniquement.

MELANGE / CO-APPLICATION : Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations sur les produits devant être co-appliqués ou non. Certains paramètres, extérieurs au contrôle du fabricant ou du distributeur, peuvent avoir des répercussions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en premier. Vous pouvez également contacter le fabricant ou le distributeur pour obtenir des conseils

IMPORTANT : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, telles que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité et la conservation de ses produits, vendus dans leur emballage d'origine sur la durée mentionnée sur les fiches techniques. Il garantit leur conformité à la formule indiquée sur l'emballage et à la réglementation en vigueur. Pour toute demande de fiche de sécurité, merci de contacter : fds-msds@agro-nutrition.fr

